

نيوكريباكس

التركيب والسواغات : فينيل إفرين هيدروكلورايد 5 mg - باراسيتامول 500 mg - كلورفينيرامين ماليات 2 mg - نشاء معدل - تالك - نشاء الذرة - بولي فينيل بيروليدين - حمض الشمع.

الخواص :

هذا الدواء هو مشاركة لمضاد للهيستامين، مضاد احتقان، و مسكن للألم. وهو يعمل عن طريق حصر الميستامين الذي يسبب العطاس، سيلان الأنف، والدمع. كما أنه يخفف احتقان الأنف والألم المصاحب لضغط الجيوب الأنفية، ويجفف الأنف والصدر

الاستطبابات :

يستطع لتخفيض أعراض الرشح والانفلونزا وحى القش أو غيرها من حساسيات الجهاز التنفسى: مثل آلام الخفيفة، والتهاب الحلق، والصداع، واحتقان الأنف، العطاس، انسداد و سيلان الأنف، حكة الأنف أو الحلق، الدمع، يخفف الحمى و يحفز فتح الأنف و /أو الجيوب الأنفية، ويخفف من ضغط و احتقان الجيوب الأنفية .

يخفف مؤقتا الآلام البسيطة المترافقه مع الصداع، وألم في العضلات، والتهاب المفاصل البسيط، الرشح، ألم الأسنان، وتشنجات الحيض. ويمكن أيضا أن يستخدم لعلاج حالات أخرى على النحو الذي يحدده الطبيب.

مضادات الاستطباب:

- إذا كان المريض يعاني من الحساسية تجاه أي من مكونات المستحضر أو مع أدوية أخرى تحوي نفس تركيب الماد الفعالة .
- في المرضى الذين يتناولون مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOI) (مضادات الاكتئاب، الأدوية النفسية ، أو أدوية الباركينسون) (مثل، فينيليزين) أو خلال أسبوعين من إيقاف MAOI .
- الأطفال أقل من عمر 6 سنوات.
- يجب عدم استعماله لجعل الطفل ينام .

التحذيرات والاحتياطات :

- مدة العلاج لا تتجاوز 5 أيام .
- قد يسبب هذا الدواء النعاس والدوخة. ينبغي تجنب القيادة أو القيام بأى شيء من الممكن أن يكون خطرا حتى يعلم المريض ردة الفعل لهذا الدواء .
- استخدام هذا الدواء لوحده، مع بعض الأدوية الأخرى، أو مع الكحول قد يقلل من القدرة على القيادة أو أداء مهام أخرى التي من الممكن أن تكون خطيرة.
- ينبغي عدم استخدام أدوية الحمية أو الشهية مع هذا الدواء دون استشارة الطبيب.
- إذا كان المريض يعاني من مشكلة في النوم، أسأل الطبيب أو الصيدلي عن أفضل وقت في اليوم لأخذ الدواء.
- ينصح بأخذ الحذر عند استخدام هذا الدواء في كبار السن لأنهم قد يكونون أكثر حساسية لتأثيره، وعند الأطفال دون سن 12 سنة من العمر لأنه لم يتم تأكيد السلامة والفعالية في هذه الفئة العمرية.
- تحذير كبدى: يحتوى هذا المنتج على الباراسيتامول. قد يحدث تلف كبدى شديد إذا كان المريض يأخذ أدوية أخرى تحتوى على الباراسيتامول أو أن المريض يتناول أكثر من 5 جرعات (معلق) أو أكثر من 12 مضغوطة في 24 ساعة ، وهو الحد الأقصى لل لكمية اليومية . استعمال الكحول مع هذا الدواء قد يزيد من خطر تلف الكبد.
- تحذير التهاب الحلق: إذا كان التهاب الحلق شديد، أو إن استمر لأكثر من يومين ، أو إذا صاحبه أو تلاه حمى، صداع، طفح جلدي، غثيان، إقياء، يجب استشارة الطبيب فورا.
- ردود فعل جلدية: قد يحدث مثل (متلازمة ستيفن جونسون / انحلال البشرة السمي التخري). التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية سيئة للغاية التي قد تستمر وأحيانا الموت. يجب الحصول على المساعدة الطبية على الفور إذا كان المريض لديه علامات

مثل احمرار، تورم، تقرح، أو تقشير الجلد (مع أو بدون حمى)؛ احمرار العين أو تجيجها. أو تقرحات في الفم، الحلق، الأنف أو

العينين

أسأل الطبيب قبل الاستخدام إذا كان المريض يعاني من:

مرض كبدي، كلوي أو قلبي، ارتفاع ضغط الدم، مرض في الغدة الدرقية، داء السكري، انسداد بولي أو صعوبة في التبول، تضخم غدة البروستات، ومشاكل تنفسية (انفاس الرئة أو التهاب القصبات المزمن، الربو)، والزرق، مشاكل الغدة الكظرية (على سبيل المثال، ورم القوام) توقف التنفس أثناء النوم، واضطرابات النوم، مشاكل في المعدة، والتهاب الكبد الفيروسي، والحساسية للأدوية والأعذية، أو مواد أخرى.

توقف عن الاستخدام واستشر الطبيب في حال:

إذا أصبح المريض عصبي أو أصيبي بالدوار أو الأرق، إذا زادت الأعراض سوءاً أو دامت أكثر من 7 أيام (للبالغين) وأكثر من 5 أيام (للأطفال)، إذ زادت الحمى سوءاً أو استمرت لأكثر من 3 أيام، إذا حدث احمرار أو تورم، إذا حدثت أعراض جديدة

التدخلات الدوائية:

- مثبطات (COMT) : مثل : (دروكسي دوبا ، الإيزونيازيد ، صوديوم أوكسيبيات (GHB))، أو مضادات الاكتتاب
- ثلاثة الحلقات مثل (الأمفيتامين) : الإعطاء المترافق قد يزيد من خطورة التأثيرات الجانبية .
- مضادات التخثر (مثل الوارفارين)، بروموكريتين، فيورازولدون، مثبطات MAO (مثل : على فينيزدين)، أو مثبطات قبط السيروتونين الانتقائية (مثل: فلوكسيتين): يزيد الإعطاء المترافق من الفعل والأثار الجانبية لهذه الأدوية .
- الأدوية الخافضة للضغط مثل حاصرات بيتا (مثل : أتنيولول) وغوانيثيدين: قد تكون هذه الأدوية أقل فعالية مع هذا الدواء .
- المنومات والمركتانات قد تزيد من التأثير المنوم ،

الآثار الجانبية:

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة: دوخة؛ النعاس. جفاف الفم والأنف، أو الحلق. صداع؛ غثيان؛ عصبية. صعوبة في النوم. قد يحدث استئارة عند الأطفال .

الحمل والإرضاع :

من غير المعروف ما إذا كان هذا الدواء يمكن أن يسبب ضرراً للجنين. إذا أصبحت المريضة حاملاً في حين أخذ هذا الدواء، يجب مناقشة الطبيب من أجل فوائد ومخاطر استخدام هذا الدواء أثناء الحمل .
تعزز بعض مكونات هذا الدواء في حليب الأم . إذا كانت المريضة ستقوم بالإرضاع أثناء تناول هذا الدواء، يجب مناقشة المخاطر على الطفل مع الطبيب.

الجرعة وطريقة الاستخدام :

- يمكن أن تؤخذ مع الطعام في حالة حدوث اضطراب في المعدة. في حال نسيان جرعة يجب أخذها في أقرب وقت ممكن ، إذا كان وقت الجرعة القادمة يجب تخطي الجرعة وأخذ الجرعة التالية . تجاوز الجرعة الموصى بها من هذا الدواء لا يزيد من تحسن الحالة بشكل أسرع ويمكن أن يزيد من خطر الآثار الجانبية.
- مدة العلاج لا تتجاوز 5 أيام.
- البالغين والأطفال 12 سنة وما فوق: مضغوطتان من (500 ملг ، 2 ملг ، 5 ملг) كل 4 ساعات.
- الأطفال 6-12 سنة: لا تستخدم المضغوطات عند الأطفال تحت سن 12 سنة من العمر، معلق (ملقطتان شاي أو 10 مل) إذا لزم الأمر تكرر الجرعة كل 4 ساعات في حال استمرار الأعراض ، لا يعطى أكثر من 5 مرات في 24 ساعة.
- الأطفال أقل من 6 سنوات من العمر: مضاد استطباب .

فوط المجموعة :

يمكن أن تشمل الأعراض عدم انتظام أو سرعة في ضربات القلب ، حمى ، هلوسة، غثيان ، اختلاج ، التعرق، رجفان ، صعوبة في التنفس، نعاس غير عادي أو الدوخة ، الإقياء . يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك تلف الكبد .

شروط الحفظ : يحفظ في درجة حرارة تحت 30 م

التعبئة: عبوة تحوي 20 مضغوطة من نيو كريباكس

عبوة تحوي 500 مضغوطة من نيو كريباكس

NEW GRIPAX

Composition and ingredients:

Phenylephrine hydrochloride: 5 mg

Paracetamol: 500 mg

Chlorpheniramine Maleate: 2 mg

Pregelatinized starch : 7mg

Talc : 2 mg

Corn starch : 5 mg

PVP k 30 : 10.5 mg

Stearic acid : 3 mg

Properties:

This drug is an antihistamine, decongestant, and pain reliever combination. It works by blocking histamine that causes sneezing, runny nose, and watery eyes. It also relieves nasal congestion and pain associated with sinus pressure, and dries the nose and chest

Indications:

It is indicated for relieving symptoms of colds, flu, hay fever or other respiratory allergies: such as minor pains, sore throat, headache, nasal congestion, Sneezing, stuffy and runny nose, itching of the nose or throat, watery eyes, reduces fever and it promotes nasal and/or sinus drainage, relieves sinus congestion and pressure.

Temporarily relieves minor pains associated with headache, muscular aches, minor arthritis, common cold, toothache, menstrual cramps.

It may also be used for other conditions as determined by the doctor

Contraindications:

- If the patient is allergic to any ingredient of the drug or with other drugs contains the same active ingredients.
- In patients who is taking monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (anti-depressant, psychiatric drugs, or Parkinson's drug) (eg, phenelzine) or for 2 weeks after stopping the MAOI drug.
- Children under 6 years of age.
- It shouldn't be taken to make a child sleep.

Warning and precautions:

- Duration of therapy should not exceed 5 days.
- This drug may cause drowsiness or dizziness. Driving or doing anything that could be dangerous and should be avoided until the patient knows how he reacts to it.
- Using this drug alone, with certain other medicines, or with alcohol may lessen the ability to drive or perform other potentially dangerous tasks.

- Diet or appetite medicines shouldn't be taken with this drug without checking with the doctor.
- If the patient is having trouble sleeping, ask the doctor or pharmacist about the best time of the day to take the drug
- Caution is advised when using this drug in the ELDERLY because they may be more sensitive to its effects and in CHILDREN younger than 12 years of age because Safety and effectiveness in this age group have not been confirmed.
- Liver warning: This product contains paracetamol. Severe liver damage may occur if the patient is taking other drugs containing paracetamol or the patient takes more than 5 doses (suspension) or more than 12 (tab) in 24 hours, which is the maximum daily amount. Alcohol use combined with this drug may increase the risk for liver damage
- Sore throat warning: If sore throat is severe, or it persists for more than 2 days, or it is accompanied or followed by fever, headache, rash, nausea, or vomiting, consult the doctor promptly.
- Skin reactions: such as (Stevens–Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis) may happen. It can cause very bad health problems that may persist and sometimes death. Get medical help right away if the patient has signs like red, swollen, blistered, or peeling skin (with or without fever); red or irritated eyes; or sores in the mouth, throat, nose, or eyes.

Ask a doctor before use if the patient has:

Liver, kidney or heart disease , high blood pressure, thyroid disease ,diabetes , urinary blockage or difficulty urinating ,an enlarged prostate gland, breathing problem (emphysema or chronic bronchitis, asthma),glaucoma ,adrenal gland problems (eg, pheochromocytoma)sleep apnea, trouble sleeping, stomach problems, viral hepatitis ,allergies to medicines, foods, or other substances.

Stop use and ask a doctor:

If the patient gets nervous, dizzy or sleepless, If symptoms get worse or lasts more than 7 days (for adults) and more than 5 days (for children), If fever gets worse or lasts more than 3 days, redness or swelling is present, new symptoms occur.

Drug interactions:

- Catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitors : e.g : (droxidopa, isoniazid, sodium oxybate (GHB)), or tricyclic antidepressants (eg, amitriptyline): the concomitant administration may increases the risk of side effects
- Anticoagulant (eg, warfarin), bromocriptine, furazolidone, MAO inhibitors (eg, phenelzine), or selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) (eg, fluoxetine): the concomitnatin administarion increases the actions and the side effects of these drugs.
- Antihypertensive drugs such as beta-blockers (eg, atenolol) and guanethidine: these medicines may be less effective with the drug.
- sedatives and tranquilizers may increase the drowsiness effect

Side effects:

COMMON side effects include: Dizziness; drowsiness; dry mouth, nose, or throat; headache; nausea; nervousness; trouble sleeping. Excitability may occur, especially in children

PREGNANCY and BREAST-FEEDING:

It is unknown if this drug can cause harm to the fetus. If the patient becomes pregnant while taking this drug, the benefits and risks of using this drug during pregnancy should be discussed with the doctor.

Some of the ingredients in this drug are excreted in breast milk. If the patient will be breast-feeding while taking this drug, the risks to the baby should be checked with the doctor.

Dosage and administrations:

- It may be taken with food if stomach upsets occur. If u missed a dose take it as soon as possible if it is time for the next dose skip the dose the dose and take the next dose. Exceeding the recommended dose of this drug will not improve the condition faster and may increase the risk of side effects.
- Duration of therapy should not exceed 5 days.
- Adults and children 12 years and over: 2 tablets of (500 mg, 2 mg ,5 mg) every 4 hours.
- Children 6 to 12 years: the tab shouldn't be used in children under 12 years of age, suspension (2 tsps or 10 mL) if needed repeat dose every 4 hours while symptoms last, do not give more than 5 times in 24 hours.
- Children below 6 years of age: contraindicated
- shake the suspension well before use

OVERDOSE:

Symptoms may include fast or irregular heartbeat; fever; hallucinations; nausea; seizures; sweating; tremors; trouble breathing; unusual drowsiness or dizziness; vomiting. Could cause serious health problems, including liver damage

Storage conditions: store at temperature below 30 c.

How supplied:

Box of 20 tablets for NEW GRIPAX

Box of 500 tablets for NEW GRIPAX