

التركيب:

كل بويبة مهبلية تحتوي على:

بوفيدون إيوهين 250 ملغ

الخصائص:

يعتبر يوفيدون إيريدن مطهر، مبيد للجراثيم واسع الطيف، ومبيد للفطريات.

الاستطبابات:

يستخدم لمعالجة الإناث المهدبة الموضعية بالجرائم الحساسة، تتضمن (التهاب المهبل بالمبيضات البيض، التهاب المهبل بالمشعرة المهدبة، العدوى المختلطة وغير النوعية، العلاج قبل الجراحى، لأمراض النساء والتوليد، التنظيف الموضعي).

مضادات الاستطباب:

يجب عدم استخدام بوفيدون إيوودين في الحالات التالية:

- الحساسية تجاه أي من المكونات وخاصة البوفيدون أليودين.
 - الاستخدام طويلاً للأمد خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.
 - الاستخدام طويلاً للأمد خلال الإرضاع.

التحذيات:

- تجنب الاستخدام المطول أو المتكرر. نظراً لارتشاف اليود من المخاطية، قد يؤدي الاستخدام المطول لبوفيدون إيبودين إلى تأثيرات جهازية.
 - لا يستخدم كمطهر إسعافي أولي لمدة تزيد عن أسبوع.
 - لا يستخدم على مناطق واسعة من الجسم.
 - في حالة الإصابة بعدوى في الأعضاء التناسلية، قد يكون شريك مصاباً بالعدوى رغم أنه لا تظهر عليه أي أعراض. إذا لم يتم علاجه كما معًا، فمن الممكن إعادة التلوث.

تأثيرات الجانية:

مع الإعطاء المتكرر والمطrol، قد يحدث زيادة في الحمل اليودي الذي من الممكن أن يؤدي إلى خلل في وظيفة الغدة الدرقية. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يحدث تهيج في الأغشية المخاطية. تفاعلات حساسة استثنائية، تتضمن: الشئي، وذمة وعائمة، صدمة ثانية.

التدخلات الدوائية:

- مبيدات النطاف: قد يؤدي أي علاج مهلي موضعى إلى تعطيل وسائل منع الحمل المبيدة للنطاف.
 - المطهرات الزئقية: يؤدي الاستخدام المتزامن للمطهرات اليودية والزئقية إلى حدوث: احمرار جلد، فقاعات، ت الخ مخاطي جلدي.

الحمل والإرضاع:

- لم تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات تأثيراً ماسحاً. في الدراسات السريرية، لا توجد بيانات ذات صلة لتقدير تأثير الشحوم المختتم عند إعطاء بوفيدون أيودين خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل.
 - قد تؤدي زيادة الحمل البوبي، غالباً مع الاستخدام طويلاً للأمد للبوفيدون أيودين ، إلى قصور الغدة الدرقية الجيني أو البيولوجي أو حتى السريري (تضخم الغدة الدرقية). وفقاً لذلك، يعتبر الاستخدام المطول للجينيوبودين مضاد استطباب من الثالث الثاني للحمل.
 - يعبر البوتاسيوم إلى الحليب الأم بتركيز أعلى من البلازمما. نظراً لوجود خطر قصور الغدة الدرقية عند الرضع، يعتبر العلاج المطول باستخدام البويفيدون أيودين مضاد استطباب أثناء الإرضاع.

الجرعة وطريقة الاستخدام:

النساء البالغات: بويضة واحدة في عمق المهبل كل ليلة ملدة 8 إلى 16 يوم.

فِطْ الجُمْعَةِ:

يمكن ملاحظة خلا في وظيفة الغدة الدرقية في حال فرط الجرعة. المعالجة تكون عرضية.

شوط الحفظ: يحفظ في درجة حرارة دون 25°C.

التعينة: علبة كرتون تحوي 6 بياضات نسائية مغلفة.

علية كتون تحتو، 8 بوصات نسائية مغلفة.

Composition:

Each vaginal ovule contains:

Povidone Iodine 250 mg

Properties:

Povidone iodine is antiseptic with broad spectrum bactericidal and fungicidal.

Indications:

Local treatment of vaginal infections with sensitive germs, including (Candidate vaginitis, trichomonas vaginitis, non-specific and mixed infection, pre-operative treatment of obstetrics and gynecology, local cleaning).

Contraindications:

Povidone Iodine should not be used in the following situations:

- History of allergy to any of the constituents, especially povidone iodine.
- During the 2nd and 3rd trimester of pregnancy, with prolonged use.
- During breastfeeding with prolonged use.
- Povidone Iodine is generally not recommended in combination with spermicidal products as well as mercury-derived antiseptics.

Warnings:

- Avoid prolonged or repeated use. Due to transmucosal resorption of iodine, prolonged use of Povidone Iodine may expose to systemic effects.
- Do not use a first aid antiseptic longer than one week.
- Do not use over large areas of the body.
- In the event of a genital infection, your partner may be contaminated even though he does not show any symptoms. If not treated together, recontamination is possible.

Side effects:

With repeated and prolonged administrations, iodine overload may occur that can lead to thyroid dysfunction. In addition, there may be irritation of the mucous membranes.

Exceptionally hypersensitivity reactions, including: urticaria, angioedema, anaphylactic shock.

Drug Interactions:

- **Spermicides:** Any local vaginal treatment may inactivate local spermicidal contraception.
- **Mercurial antiseptics:** The concomitant use of iodinated and mercurial antiseptics lead to the occurrence of: erythema, phlyctens, even mucocutaneous necrosis.

Pregnancy & Lactation:

- Animal studies have not shown a teratogenic effect. In the clinic, there are currently no sufficiently relevant data to assess a possible malformities effect of povidone iodine when administered in the first trimester of pregnancy.
- Iodine overload, very likely with prolonged use of Povidone Iodine, can lead to fetal, biological or even clinical hypothyroidism (goiter). Accordingly, prolonged use of Povidone Iodine is contraindicated from the 2nd trimester.
- Iodine passes into milk at higher concentrations than maternal plasma. Due to the risk of hypothyroidism in infants, breastfeeding is contraindicated with prolonged treatment with **Povidone Iodine**.

Dosage & Administration:

Adult Women: One ovule in the vaginal depth every night for 8 to 16 days.

Overdose:

In case of overdose thyroid dysfunction can be observed. Treatment will be symptomatic.

Storage conditions: Store at temperature below 25°C.

How supplied: 6 vaginal ovules packed in a carton package.

8 vaginal ovules packed in a carton package.